

Naam patiënt:

Patiëntnummer:

OPAT - Checklijst ziekenhuisbreed traject

OPSTART OPAT

Verantwoordelijke	Taak	# werkdagen tot ontslag (dag 0 = ontslagdatum)
Behandelende arts	Vraag een consult aan bij een infectioloog !!! Zonder positief advies van een infectioloog, kan OPAT niet van start gaan!!!	- 3
Infectioloog	Controleer de inclusie criteria voor OPAT - Geen IV → PO switch mogelijk - Patiënt is klinisch stabiel en heeft een stabiele nierfunctie - Patiënt verkeert in een adequate mentale en cognitieve toestand - Er is geen medicatie, drug- of alcoholmisbruik gekend - Het is financieel haalbaar voor patiënt - Er is voldoende ondersteuning van familieleden of mantelzorgers in de ambulante setting - Minstens 5 dagen thuisbehandeling na ontslag - De patiënt heeft minstens 2 toedieningen van het antibioticum toegediend gekregen tijdens de hospitalisatie - Indien vancomycine: Patiënt heeft minstens 2 opeenvolgende therapeutische plasmaspiegels vancomycine (TDM) tijdens hospitalisatie	- 3
	Definieer het gepaste antibioticum , de toedieningsweg , de toedieningswijze en therapie duur (zie ook " Voorbereidend OPAT Voorschrift ")	- 3
	Informeer de patiënt - Geef informatie over de inhoud van het zorgprogramma (zie OPAT informatieboekje voor patiënt "bolus of infuus", elastomeerpomp" of "elastomeerpomp met TDM") - Bespreek het financiële plaatje (zie Excel datasheet: "Voorbereidend OPAT Voorschrift") Vraag zo nodig advies aan de distributie apotheker (dect 2500 – optie 2 – optie 3: distributie apotheker) - Bespreek het Informed Consent (IC) en laat de patiënt dit tekenen (zie "OPAT Informed Consent patiënt") - Indien vancomycine: Bespreek met de patiënt dat hij/zij tijdens de thuishospitalisatie regelmatig (ongeveer wekelijks) zal moeten terugkeren naar het ziekenhuis voor bloedafname ter controle van de nierfunctie en TDM van vancomycine. De patiënt zal zich die dag moeten aanmelden bij bloedafname tussen 8u-10u en om 15u30 de nieuwe elastomeerpompen moeten afhalen bij de apotheek (pompen worden bereid door de apotheek). Nadien zal de patiënt zijn pomp laten wisselen op de dagzaal in het ziekenhuis. !!! Indien de patiënt het IC niet tekent, kan OPAT niet van start gaan!!!	- 3
	Maak een JINF contact aan in KWS en voeg patiënt toe aan de OPAT-lijst (contact menu – voeg toe aan TeBesprekenGevalen – JINF – OPAT - OK)	- 3
	Maak een OPAT-nota in KWS (opvolgnota's – selecteer JINF – voeg opvolgnota toe – gebruik sneltekst opatf – vul de lege velden aan)	- 3
	Maak een consultverslag en voeg bovenaan "OPAT" toe bij probleemstelling (doorsturen naar de huisarts)	-3
	Geef een seintje aan de sociale dienst (dect 2040) & ziekenhuisapotheek (dect 3364)	-3
Behandelende arts	Leg de te verwachten ontslagdatum vast	-3

	Vraag geschikte intraveneuze toegangsweg aan (zie " OPAT Keuze toegangsweg ") - Indien elastomeerpomp: voorkeur PICC katheter	-3
Chirurg / Radioloog / Anesthesist	Plaats intraveneuze katheter	-3
Behandelende arts	Contacteer de sociale dienst (dect 2040) om de thuisverpleegkundige te contacteren	-3
	Contacteer de ziekenhuisapotheek (dect 3364) zodat medicatie en materiaal kan klaargelegd worden op dag van ontslag en indien van toepassing, de bereiding van de elastomeerpompen kan worden ingepland.	- 3
	Licht de (hoofd)verpleegkundige in over opstart OPAT	- 3
	Maak ambulante voorschriften voor de OPAT behandeling (voorschriftduur van 3 maanden of met een einddatum) - Gebruik ambulant voorschriftschema in KWS: (Thuis)therapie – schema – selecteer correcte schema (zie " OPAT Handleiding ambulante voorschriften in KWS ")	- 3 tot - 1
	Maak een voorschrift op voor thuisverpleegkundige	- 3 tot - 1
	Bezorg het IC en de ambulante voorschriften aan de ziekenhuisapotheek, minstens 1 dag voor ontslag	- 3 tot - 1
Sociaal werker	Overleg met de patiënt - Voer een sociaal onderzoek uit - Geef informatie over de thuiszorg	- 3
	Contacteer Thuiszorg - Regel een thuisverpleegkundige - Maak een opvolgnota in KWS met de contactgegevens van de thuisverpleegkundige en info betreft de OPAT therapie	- 3 tot - 1
	Overleg met de patiënt Geef feedback over thuiszorgregeling	- 3 tot 0
	Contacteer en informeer de huisarts over OPAT opstart	-3 tot 0
	Informeer de apotheek over thuiszorgregeling (dect 3364)	-3 tot 0
(Katheter)verpleegkundige	Controleer of de katheter van de patiënt ontslagklaar is & informeer patiënt over toedieningsaspecten	- 1
Infectioloog	Plan een opvolgconsultatie 1 ^{ste} keer 7 – 14 dagen na ontslag	-1
Ziekenhuisapotheker	Zet medicatie, materiaal en de infodocumenten klaar voor ophaling Bij opstart wordt afgeleverd voor 7 dagen, nadien telkens per 14 dagen Indien elastomeerpomp: Bereiding van de pompen gebeurt door steriele bereidingen. 1 pomp wordt reeds afgeleverd aan de hospitalisatie-afdeling. De overige pompen worden afgeleverd aan de patiënt aan de balie.	-1
Behandelende arts	Voorzie de nodige ontslagdocumenten en bezorg aan de hoofdverpleegkundige - Brief voor de huisarts (zie "OPAT Brief voor huisarts") - Brief en voorschrift voor thuisverpleegkundige (zie "Voorschrift thuiszorg" & "OPAT Brief voor thuisverpleegkundige")	0
Verpleegkundige	- Katheterzorg bij ontslag (zie "OPAT Checklijst verpleegkundige") - Indien elastomeerpomp: Koppel het lopend continu infuus van het antibioticum af en koppel de gevulde pomp van de apotheek aan (zie "OPAT toedieningsprotocol aankoppelen elastomeerpomp bij ontslag")	0
Ziekenhuisapotheker	Lever medicatie en materiaal af en spreek een datum vast met de patiënt voor de volgende ophaling.	0

OPVOLGING/VERLENING OPAT

Verantwoordelijke	Taak
Infectioloog	Maak ambulante voorschriften voor de verlenging van de OPAT behandeling <u>Geneesmiddelenvoorschrift</u>: patiënt haalt op in de ziekenhuisapotheek. <i>Informeer de patiënt over de levertijden van de ziekenhuisapotheek. Ophaling gebeurt bij voorkeur een dag na indienen van de voorschriften.</i> <u>Voorschrift voor thuisverpleegkundige</u>: patiënt bezorgt voorschrift aan de thuisverpleegkundige.
	Plan een opvolgconsultatie om de 2 – 4 weken
	Geef feedback aan de thuisverpleegkundige
	Geef feedback aan de ziekenhuisapotheker ivm wijzigingen/verlengingen van de therapie